

Atragantamiento



Historia Real

Una niña de dos años masticaba un globo en su casa. Accidentalmente se lo tragó y tuvo dificultad para respirar. El personal de Emergencias, llevó a la niña al hospital donde le sacaron el globo, pero la niña murió.

-De los archivos de los Medical Examiners and Coroners Alert Project, MECAP por sus siglas en inglés.

Datos

- En el año 2002, 885 niños de 14 años y menores murieron de atragantamiento (41% comidas y 59% no-comidas). En el año 2003, más de 18,000 niños fueron tratados en las salas de emergencias de hospitales por episodios de atragantamiento.
- Niños están a riesgo de atragantamiento con comidas pequeñas y redondas como salchichas (hot dogs), dulces, nueces, uvas, zanahorias y palomitas de maíz.
- Peligros de atragantamiento con objetos que no son comidas, usualmente son objetos redondos como, monedas, pelotas pequeñas y globos.
- Obstrucción de las vías aéreas puede también resultar por enredo o trampa tal como cordones cubiertos por ventanas, lazos de ropa o listones de los muebles.

Lo Qué Puede Hacer

- Siempre supervise a los niños pequeños cuando están comiendo y jugando .
- No permita que niños de 6 años y menores coman comidas pequeñas, redondas o duras, incluyendo las salchichas (hot dogs).
- Mantenga objetos pequeños como ganchos, joyas y botones fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese que los niños jueguen con juguetes apropiados para su edad según la etiqueta de seguridad.
- Inspeccione los juguetes viejos y los nuevos regularmente para saber si están dañados.
- Aprenda los primeros auxilios y RCP (Reanimación Cardiopulmonar).



Led By

**BLANK CHILDREN'S
HOSPITAL**
IOWA HEALTH SYSTEM

Safe Kids Greater Des Moines, encabezada por Blank Children's Hospital, es una organización dedicada a prevenir lesiones no-intencionales en niños de 0-14 años de edad. Para más información llame al (515) 241-6293 o visite www.dsmsafekids.org.