


Seguridad de Juguete



Historia Real

Un niño de 2 años estaba jugando en la cocina en su casa mientras su madre limpiaba. El niño comenzó a atragantarse con una pelota de juguete pequeña. Varios esfuerzos para removerla fueron infructuosos. Una ambulancia llevó al niño al hospital donde fue pronunciado muerto. La causa de muerte fue asfixia.

-De los archivos de los Medical Examiners and Coroners Alert Project, MECAP por sus siglas en inglés.

Datos

- Cada año más de 155,400 niños de las edades de 14 años y menores son tratados en las salas de emergencia de hospitales por heridas relacionadas con juguetes.
- Las heridas más comunes son causadas por los siguientes tipos de juguetes: juguetes con partes pequeñas separables, juguetes con bordes o puntas agudas, juguetes que hacen ruidos fuertes, juguetes que propulsan dardos, juguetes con cuerdas más largas de siete pulgadas, juguetes eléctricos, juguetes pintados con pintura a base de plomo, pistolas de juguetes.
- La causa principal de muertes relacionadas con juguetes es estrangulación o asfixia con una pelota de juguete.
- Los juguetes de montar (incluyendo las patinetas sin motor) se asocian con más heridas que cualquier otro grupo de juguetes.

Lo Qué Puede Hacer

- Compre juguetes de edad apropiada para los niños.
- Evite globos de látex para niños pequeños.
- Provea apropiada supervisión adulta cuando estén jugando.
- Enseñe a los hermanos mayores a recoger sus juguetes de edad apropiada y a ponerlos fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga un probador de partes pequeñas en su casa para usarlo cuando tenga duda. Un rollo vacío de papel de baño puede ser utilizado en vez del probador de partes pequeñas.



Led By

**BLANK CHILDREN'S
HOSPITAL**
IOWA HEALTH SYSTEM

Safe Kids Greater Des Moines, encabezada por Blank Children's Hospital, es una organización dedicada a prevenir lesiones no-intencionales en niños de 0-14 años de edad. Para más información llame al (515) 241-6293 o visite www.dsmsafekids.org.